

# 女孩乳牙掉后不长新牙 皮肤像50岁

牙医检查发现是先天性罕见病

生活报讯 (记者王晓丁) “对这个11岁的女孩印象很深,她皮肤干燥、面容衰老、眉毛淡而稀疏,嘴唇褶皱就像牙都掉光的老人,拍片才发现基本没有恒牙牙胚。”在哈市从医14年的儿童牙医姜萍告诉记者,近日,一位父亲带女儿来诊所咨询换牙问题时,却意外地发现,女孩得的不是牙病,而是一种罕见的先天遗传性疾病:外胚叶发育不良综合征。

## 女孩乳牙掉落后没长新牙 11岁的皮肤看起来像50岁

今年年初,赵先生带女儿小红来到位于哈市清滨路的一家口腔诊所咨询,“女儿11岁了,早就到了换牙的年龄,而乳牙掉了好多年,一直没长出新牙。”赵先生说,自己也是这两年才发现问题的严重性,随即带她去几家大医院求医,拍出片子后,大夫给出的结论都是,需要镶牙。这么小的孩子就要镶牙,赵先生一时不能理解,于是在朋友介绍下,来到了这家专业从事儿童牙病医治的口腔诊

所。姜萍从医14年,专职儿童牙医也已有4年多的经验,当她第一次看到小红时,第一反应是,孩子得的不是牙病。“孩子一进来,我看她的状态就不像是一个11岁的孩子,皮肤状态像50岁的人,特别干燥,眉毛稀疏,拿片子一看,发现女孩先天恒牙大量缺失,基本没有恒牙牙胚。”姜萍告诉记者,孩子的症状符合一种遗传性的染色体隐性遗传——外胚叶发育不良综合征。

生活报记者了解到,先天性外胚叶发育不良又称先天性外胚层发育不良综合征。是一组外胚层发育缺损的先天性疾病,累及皮肤及其附属结构如牙和眼,间或波及中枢

### 原是外胚叶发育不良综合征 尚无有效治疗方法

在跟赵先生聊天的过程中,姜萍了解到,这几年除了牙病,他带孩子看的最多的是皮肤病。“孩子不太爱出汗,所以总是体温高,皮肤还干燥,去很多大医院看过,没有一个皮肤病大夫把这个症状跟她的牙病结合在一起,也没有牙科大夫结合皮肤病给出综合诊断意见的。”赵先生说。姜萍告诉记者,她还将孩子的照片和X光片发给了天津一位著名的儿童牙医专家,得到的结论都是,病症符合外胚叶发育不良综合征。

生活报记者了解到,先天性外胚叶发育不良又称先天性外胚层发育不良综合征。是一组外胚层发育缺损的先天性疾病,累及皮肤及其附属结构如牙和眼,间或波及中枢

神经系统,有时可伴有其他异常。患者会出汗少或无汗症状,额头凸出,颧骨高而宽,鼻梁塌陷如马鞍形,鼻尖小且上翘,口唇增厚,似早老。此外,患者牙齿会有异常,会有乳牙及恒牙完全缺失或部分缺失,牙龈萎缩,唾液腺发育不良等症状。据《儿童口腔病学》介绍,无汗型发病率率为1/100000。据了解,此病尚无有效治疗方法,应限制体力劳动,不宜在热环境中生活。姜萍已建议赵先生,最大程度地保留小红口腔内现有的牙齿,并治疗龋齿,时机合适再做种植牙或者活动义齿修复。

(文中赵先生和小红均为化名)

## 理财生财有道俱乐部会员看这里 本金兑付完 认购还有好礼拿

生活报讯 (记者李丹) “生财有道俱乐部”成立以来,得到了读者青睐,注册成为会员后获得免费的理财咨询,截至目前,生活报生财有道俱乐部已经联合多家媒体,同步向会员推荐了10余款政信类理财产品。在10月份,俱乐部为会员推荐的第一款甲子金安一号产品本金和利息已经全部按时兑付完成。认购俱乐部为会员推荐的西秀流动资金项目也已经开始兑付第一季度的利息,此项目付息方式是在认购之后的三个月支付利息,届时会员会收到信息,请注意查收。

特别提醒广大会员:  
到现场办理认购业务时请带好本人身份证、银行卡和手机  
理财有风险,投资需谨慎!

俱乐部地址:  
哈市道里区地段街一号 黑龙江日报报业集团一楼 生财有道俱乐部  
咨询电话:  
0451-55057888/0451-55303777  
官方网址:  
www.scydlb.com



扫描  
管理员拉你进群

## 我省15家单位获批 设立博士后科研工作站

生活报讯 (记者刘畅言) 5日,记者从省人社厅了解到,我省15家单位被人力资源和社会保障部批准设立博士后科研工作站。涉及软件和信息服务、互联网、制造业、科学研究与服务、生物医药等新兴产业。截至目前,全省共设有博士后科研流动站和科研工作站218个。其中,博士后科研工作站121个;博士后科研流动站97个。

15家单位名单:黑龙江新媒体集团有限公司、哈尔滨维科生物技术开发公



等一带停电。  
咨询电话:84662470  
南岗区  
11月15日 9:00-13:00  
停电范围:振兴村、儿童福利院等一带。  
咨询电话:84662474

## 老人身上有怪味 原是前列腺增生作祟

生活报讯 (记者霍营) 家住双鸭山宝清县的谷大爷今年72岁,身体硬朗,每天的生活就是干干农活、散散步,或者找其他老人唠唠嗑。可最近,谷大爷遇到一件难堪事。不久前,5岁的小孙子来家里看他,一进门就说屋子里有味道,孩子四处闻了一圈,最后捂着鼻子说爷爷身上有股怪味,这让谷大爷既尴尬又伤心。“我也是爱干净的人,可最近这两年排尿沥沥拉拉,一不小心就滴到身上。”说到这里,谷大爷心里很难过。

要不是小孙子童言无忌,无意中戳到了他的痛处,老人也不会把心中

的困扰和家人和盘托出。经过多方打听,谷大爷一家来到了黑龙江远东心脑血管医院就诊。介入科孙政育主任通过泌尿彩超检查后发现,谷大爷前列腺增生的体积较大,病情较为严重,需要尽快治疗。一听到手术,谷大爷心里又打了退堂鼓。孙政育主任告诉他,他们采用的前列腺动脉栓塞术是一种介入手术,不用开刀,只需要在大腿根部取一个针眼大小的伤口,再将如发丝一般的微导管置放在细小的前列腺动脉中,将栓塞的微粒球经由微导管注入前列腺动脉,

继而阻塞前列腺动脉,使增生的前列腺组织缺血,进而萎缩,达到排尿正常的目的。

听完孙主任的讲解后,老人悬着的一颗心终于落了地,顺利接受了手术。术后第2天,谷大爷就出院了。回家后排尿也逐渐恢复了正常,又能享受含饴弄孙的天伦之乐了。孙政育也提醒中老年男性们,一旦得了前列腺增生,不要羞于启齿,一拖再拖,最好及早到医院进行检查,在专业医生的指导下明确治疗方案。

## 老年公寓

广通达老年公寓  
环境好,电梯,有线电视,宾馆式双人间,独立卫浴,三人间24小时热水,营养配餐,招自理、半自理、失能老人  
南岗区汉阳街39号  
15776272608

德福老年公寓  
招自理、半自理、全护理老人  
道里区新阳路福民街71号  
18245135998,82698871  
慈善老年公寓  
招收自理、半自理、失能老人  
有康复器材,免费试住  
13163673190  
家庭养老  
居家养老  
同生乐乐  
15245137015

养老院出租  
13351710127

一元居家养老  
皇老人公寓  
招自理半自理失能老人  
2500元  
元吃住玩套餐

招自理、半自理、卧床老人  
老年大学兴趣班全免费  
民宿酒店  
标间、套间  
400余张床位,2500平方米娱乐空间,多功能演艺厅、电视、WIFI、冰箱、淋浴、24小时热水、呼叫器、护理员24小时服务,酒店式装修,亲情化服务。  
距哈西站500米民宿酒店  
哈西红星城3号号楼  
电话:0451-51025111  
13936510333  
乘坐57、58、82路区间车直达

声明注销  
通知寻人  
订版 84681180  
电话 15504651777

# 腿脚总是麻凉,走一会歇一会,这是咋回事?

本报、市老龄办联合发起公益普查  
四种下肢疼痛 免费查血管

生活报记者 孙军



在公园的椅子上小憩,坐久了腿脚发麻……走300米,就感觉到腿部又疼又麻……除了腿疼以外,如果你的脚趾比较难剪了,或者腿上的汗毛比以前少了,抑或是腿上血管青紫凸出,腿经常有酸痛,再者裤子也比以前穿的多了;要是这些情况都有或者有其中三两个,也许你腿上的动脉基本也就不“软乎”了!我们都知道心梗、脑梗很危险,而且可能会危及生命。其实下肢血管疾病和心梗、脑梗从发病机理上看是同一类的疾病。通俗地说就是“腿梗”。专家指出,下肢动脉硬化、静脉曲张、下肢深静脉血栓、下肢动脉血栓等都可能导致以上症状。下肢血管病会严重影响下肢的功能和日常活动,而且一旦出现腿脚的坏死,可能就有截肢的风险。

常坐姿,正常人大腿皮肤颜色10秒内会恢复正常,如果恢复时间超过45秒,可能提示这条腿处于缺血状态。

摸温度——与他人对比,如自己腿温明显较低,可能提示下肢血管病。也有患者,两条腿温度不一致,那么较低温度侧的下肢可能已出现血管病变。

警惕“沉默杀手”需深度检查

下肢血管病也被誉为“沉默的杀手”,不重视、不治疗,有截肢、致命风险。自查仅是一个初步判定方法,要想确诊,还需专业的检查。目前常见的下肢血管病有以下四种——

摸足脉——人的足背正中最高点,轻轻摸,能感受到脉动。能摸到这个部位的脉搏,证明动脉血一直通到了足背部,说明下肢血管通畅。但如果走一段距离之后,再摸,摸不到这个脉搏,可能已发生了不同程度的动脉血管狭窄。

看颜色——平躺在床上,把双脚抬高至45度左右,保持60秒。如果有一条腿苍白,提示肢体供血不足。恢复正常

下肢动脉硬化闭塞症,患者行走一段路程后,腿部出现酸痛感,停下休息后可缓解,但再行走疼痛又会加重。病

变后期足趾冰凉、发紫,静息疼痛及溃疡。长期不治会导致坏疽,甚至截肢。

下肢深静脉血栓,血液在深静脉内不正常凝结,导致血液回流障碍,形成“血栓”,一侧肢体突然肿胀,局部疼痛。严重者可引起肢体溃疡,血栓一旦脱落可形成致命性肺栓塞。

三种方法 在家自查下肢血管

那么,怎么检测下肢血管堵没堵呢?专家介绍,老人在家可以做一些小测试,自查下肢血管的健康状况。

摸足脉——人的足背正中最高点,轻轻摸,能感受到脉动。能摸到这个部位的脉搏,证明动脉血一直通到了足背部,说明下肢血管通畅。但如果走一段距离之后,再摸,摸不到这个脉搏,可能已发生了不同程度的动脉血管狭窄。

看颜色——平躺在床上,把双脚抬高至45度左右,保持60秒。如果有一条腿苍白,提示肢体供血不足。恢复正常

下肢动脉硬化闭塞症,患者行走一段路程后,腿部出现酸痛感,停下休息后可缓解,但再行走疼痛又会加重。病

变后期足趾冰凉、发紫,静息疼痛及溃疡。长期不治会导致坏疽,甚至截肢。

下肢深静脉血栓,血液在深静脉内不正常凝结,导致血液回流障碍,形成“血栓”,一侧肢体突然肿胀,局部疼痛。严重者可引起肢体溃疡,血栓一旦脱落可形成致命性肺栓塞。

摸温度——与他人对比,如自己腿温明显较低,可能提示下肢血管病。也有患者,两条腿温度不一致,那么较低温度侧的下肢可能已出现血管病变。

警惕“沉默杀手”需深度检查

下肢血管病也被誉为“沉默的杀手”,不重视、不治疗,有截肢、致命风险。自查仅是一个初步判定方法,要想确诊,还需专业的检查。目前常见的下肢血管病有以下四种——

摸足脉——人的足背正中最高点,轻轻摸,能感受到脉动。能摸到这个部位的脉搏,证明动脉血一直通到了足背部,说明下肢血管通畅。但如果走一段距离之后,再摸,摸不到这个脉搏,可能已发生了不同程度的动脉血管狭窄。

看颜色——平躺在床上,把双脚抬高至45度左右,保持60秒。如果有一条腿苍白,提示肢体供血不足。恢复正常

下肢动脉硬化闭塞症,患者行走一段路程后,腿部出现酸痛感,停下休息后可缓解,但再行走疼痛又会加重。病

变后期足趾冰凉、发紫,静息疼痛及溃疡。长期不治会导致坏疽,甚至截肢。

下肢深静脉血栓,血液在深静脉内不正常凝结,导致血液回流障碍,形成“血栓”,一侧肢体突然肿胀,局部疼痛。严重者可引起肢体溃疡,血栓一旦脱落可形成致命性肺栓塞。

三种方法 在家自查下肢血管

那么,怎么检测下肢血管堵没堵呢?专家介绍,老人在家可以做一些小测试,自查下肢血管的健康状况。

摸足脉——人的足背正中最高点,轻轻摸,能感受到脉动。能摸到这个部位的脉搏,证明动脉血一直通到了足背部,说明下肢血管通畅。但如果走一段距离之后,再摸,摸不到这个脉搏,可能已发生了不同程度的动脉血管狭窄。

看颜色——平躺在床上,把双脚抬高至45度左右,保持60秒。如果有一条腿苍白,提示肢体供血不足。恢复正常

下肢动脉硬化闭塞症,患者行走一段路程后,腿部出现酸痛感,停下休息后可缓解,但再行走疼痛又会加重。病

变后期足趾冰凉、发紫,静息疼痛及溃疡。长期不治会导致坏疽,甚至截肢。

下肢深静脉血栓,血液在深静脉内不正常凝结,导致血液回流障碍,形成“血栓”,一侧肢体突然肿胀,局部疼痛。严重者可引起肢体溃疡,血栓一旦脱落可形成致命性肺栓塞。

摸温度——与他人对比,如自己腿温明显较低,可能提示下肢血管病。也有患者,两条腿温度不一致,那么较低温度侧的下肢可能已出现血管病变。

警惕“沉默杀手”需深度检查

下肢血管病也被誉为“沉默的杀手”,不重视、不治疗,有截肢、致命风险。自查仅是一个初步判定方法,要想确诊,还需专业的检查。目前常见的下肢血管病有以下四种——

摸足脉——人的足背正中最高点,轻轻摸,能感受到脉动。能摸到这个部位的脉搏,证明动脉血一直通到了足背部,说明下肢血管通畅。但如果走一段距离之后,再摸,摸不到这个脉搏,可能已发生了不同程度的动脉血管狭窄。

看颜色——平躺在床上,把双脚抬高至45度左右,保持60秒。如果有一条腿苍白,提示肢体供血不足。恢复正常

下肢动脉硬化闭塞症,患者行走一段路程后,腿部出现酸痛感,停下休息后可缓解,但再行走疼痛又会加重。病

变后期足趾冰凉、发紫,静息疼痛及溃疡。长期不治会导致坏疽,甚至截肢。

下肢深静脉血栓,血液在深静脉内不正常凝结,导致血液回流障碍,形成“血栓”,一侧肢体突然肿胀,局部疼痛。严重者可引起肢体溃疡,血栓一旦脱落可形成致命性肺栓塞。

摸温度——与他人对比,如自己腿温明显较低,可能提示下肢血管病。也有患者,两条腿温度不一致,那么较低温度侧的下肢可能已出现血管病变。

警惕“沉默杀手”需深度检查

下肢血管病也被誉为“沉默的杀手”,不重视、不治疗,有截肢、致命风险。自查仅是一个初步判定方法,要想确诊,还需专业的检查。目前常见的下肢血管病有以下四种——

摸足脉——人的足背正中最高点,轻轻摸,能感受到脉动。能摸到这个部位的脉搏,证明动脉血一直通到了足背部,说明下肢血管通畅。但如果走一段距离之后,再摸,摸不到这个脉搏,可能已发生了不同程度的动脉血管狭窄。

看颜色——平躺在床上,把双脚抬高至45度左右,保持60秒。如果有一条腿苍白,提示肢体供血不足。恢复正常

下肢动脉硬化闭塞症,患者行走一段路程后,腿部出现酸痛感,停下休息后可缓解,但再行走疼痛又会加重。病

变后期足趾冰凉、发紫,静息疼痛及溃疡。长期不治会导致坏疽,甚至截肢。

下肢深静脉血栓,血液在深静脉内不正常凝结,导致血液回流障碍,形成“血栓”,一侧肢体突然肿胀,局部疼痛。严重者可引起肢体溃疡,血栓一旦脱落可形成致命性肺栓塞。

摸温度——与他人对比,如自己腿温明显较低,可能提示下肢血管病。也有患者,两条腿温度不一致,那么较低温度侧的下肢可能已出现血管病变。

警惕“沉默杀手”需深度检查

下肢血管病也被誉为“沉默的杀手”,不重视、不治疗,有截肢、致命风险。自查仅是一个初步判定方法,要想确诊,还需专业的检查。目前常见的下肢血管病有以下四种——

摸足脉——人的足背正中最高点,轻轻摸,能感受到脉动。能摸到这个部位的脉搏,证明动脉血一直通到了足背部,说明下肢血管通畅。但如果走一段距离之后,再摸,摸不到这个脉搏,可能已发生了不同程度的动脉血管狭窄。